


(19)



Lietuvos
Respublikos
valstybinis
patentų biuras

(10) **LT 2019 019 A**

(12) **PARAIŠKOS APRAŠYMAS**

(21) Paraiškos numeris: **2019 019**

(51) Int. Cl. (2019.01): **A01K 53/00**

(22) Paraiškos padavimo data: **2019-02-04**

(41) Paraiškos paskelbimo data: **2019-09-10**

(62) Paraiškos, iš kurios dokumentas išskirtas, numeris: **2019 007**

(86) Tarptautinės paraiškos numeris: —

(86) Tarptautinės paraiškos padavimo data: —

(85) Nacionalinio PCT lygio procedūros pradžios data: —

(30) Prioritetas: —

(71) Pareiškėjas:

Juozas PILECKAS, Merkinės g. 151, Alytus, LT

(72) Išradėjas:

Juozas PILECKAS, LT

(74) Patentinis patikėtinis/atstovas:

**Otilija KLIMAITIENĖ, AAA Law, A. Goštauto g. 40B, Verslo centras „Dvyniai“,
LT-03163 Vilnius, LT**

(54) Pavadinimas:

**Medunešių bičių sveikatos palaikymo ir gydymo būdas, naudojant vaistinių
augalų priedus**

(57) Referatas:

Išradimas atskleidžia medunešių bičių (*Apis mellifera*) maitinimo natūraliais mišiniais su vaistinių augalų priedais būdą. Maitinimo mišiniuose yra naudojamas medus, vanduo ir šie augalai: didžioji dilgėlė, juodasis serbentas, dygliuotasis šaltalankis, vienapiestė gudobelė, citrina, paprastasis amalas ir paprastasis agurkas. Išradimas aprašo bičių maitinimo mišinių su šių augalų priedais gamybą, ir bičių tikslinio maitinimo šiais mišiniais įgyvendinimo variantus. Išradime naudojamas dygliuotasis šaltalankis turi mokslškai atskleistą sudėtį ir maistines, vaistines ir gydomąsias savybes, todėl maitinant ir apšlakstant bites mišiniais su šaltalankio uogų sultimis, bei parinkus maitinimo bei priežiūros režimą, užtikrinama pilnavertė bičių mityba ir sveikatos palaikymas, prevencija nuo susirgimų (taip pat varoatozės) medunešio metu, tuo pačiu metu gerai derantys su kokybiško medaus gamybos procesais

LT 2019 019 A

MEDUNEŠIŲ BIČIŲ SVEIKATOS PALAIKYMŲ IR GYDYMO BŪDAS, NAUDOJANT VAISTINIŲ AUGALŲ PRIEDUS

IŠRADIMO SRITIS

5 Išradimas yra susijęs su medunešių bičių (*Apis mellifera*) priežiūra, maitinimu ir natūralaus medaus gamyba. Tiksliau, tai bičių maitinimo, gydymo nuo erkių ir medaus gamybos būdas, naudojant tam tikrus vaistinius augalus, kai bitės maitinamos natūralios kilmės sirupu su šių augalų priedais, o pakeistos sudėties natūralus medus gaunamas, bitėms jį sunešus savo skilveliuose (medaus pūslėse) dalinai arba pilnai iš šio maitinamojo sirupo į avilio meduves (rėmelius su koriais).

10 TECHNIKOS LYGIS

Medunešių bičių (*Apis mellifera*) maitinimas, priežiūra ir medaus gamyba yra plačiai tyrinėjamos įvairiais aspektais dėl unikalių savybių, tokių kaip bičių sveikatos ir darbingumo palaikymas, natūralaus medaus su unikaliomis ir gydomosiomis savybėmis gamyba, bei medaus naudojimas maitinti ir gydyti žmones.

15 Nuo seno žinoma, kad bičių produktai pasižymi maistinėmis ir gydomosiomis savybėmis. Plačiausiai naudojamas bičių produktas yra medus. Paprastai medų bitės kaupia savo maitinimosi atsargoms avilio koriuose. Natūraliu būdu medus koriuose gaunamas, bitėms surinkus augalų žiedų nektarą į savo skilvelius (medaus pūsles), ir sunešus jį į korių akutes, kur nektaras išlaikomas ilgesnį laiką bei virsta medumi.

20 Kultivuojamoje bitininkystėje dalį medaus iš korių žmogus išima savo reikmėms. Taip pat, bitės papildomai maitinamos ir žmogaus paruoštu bičių maistu, pavyzdžiui, bitėms pritrūkus avilyje jų pačių sunešto medaus atsargų arba šaltu žiemos metu.

25 Medunešės bitės, priklausomai nuo medunešio ir gamtos sąlygų, gali nusilpti, susirgti ir būti nevienodai pajėgios nešti medų. Maisto trūkumas sąlygoja mažesnius bičių pajėgumus nešti medų ir prastesnę sveikatą, o taip pat bites gali apnikti parazitai, iš kurių vienas pavojingiausių yra bičių erkės arba varoatozė (*varoatozis*).

Bitininkai žino būdus, kaip prižiūrėti ir maitinti bites, skatinti jas nešti daugiau medaus, paskatinti apdulkinti augalus, o taip pat natūraliai reguliuoti sunešamo medaus kokybę ir savybes, arba išgauti selektyvų medų, turintį sudėtyje tam tikrų medžiagų ir

specifines gydomąsias savybes. Selektyvus medus, jį naudojant tam tikru būdu, gali pagelbėti gydant tam tikrus negalavimus arba bendrai stiprinant sveikatą.

Bičių maitinimas sirupais su augaliniais priedais yra aprašomas keliose patentinėse paraiškose. JAV patento paraiška US2011039001A1 aprašo bičių maisto gamybos metodą, kuriame bičių maistas yra sudarytas iš augalų vaisių, lapų, sėklų, šaknų, juos apdorojus ir sumaišius su polisacharidais. Kinijos patento paraiška CN108419757A aprašo bičių žiemojimo priežiūros metodą, kuriame be avilių paruošimo, bičių apdorojimo priešerkiniais preparatais (miticidais), taip pat rašoma apie bičių maistą, kuriame įtraukti ir augalinės kilmės komponentai, pavyzdžiui, morkos, liucernos sėklos, spirulina melsvadumblis, saldymedžio šaknys ir kiti.

Bičių gydymas ir gydomasis maitinimas natūraliais priedais yra aprašomas JAV patento paraiškoje US20070026765A1. Pagal US20070026765A1 metodą, bitės gydomos apipurškiant jas vandeniniu tirpalu, kuriame yra bruknuolių, cinamono, citrinžolės, mėtų, rozmarino, pipirmėtės ir kitų augalų esencijos aliejų. Kitas, nepatentinis mokslinis, šaltinis <https://actavet.vfu.cz/83/1/0009/> atskleidžia įvairių augalinių eterinių aliejų naudojimą gydyti bites nuo amerikinio puvinio ir jo sukėlėjo *Paenibacillus larvae*.

Selektyvaus medaus su pakeista sudėtimi gamyba yra aprašoma keliuose patentuose. Japonijos 1986 metų patente JPS6121060(B2) aprašyta antrinio medaus gamyba su kiniškų gydomųjų žolių ekstraktais, kur šis medus naudojamas gaminti gėrimus. Vokietijos patento paraiškoje DE4034955 rašoma apie antrinio medaus išgavimą, pamaitinus bites sirupu iš medaus ir vaistinių augalų ekstraktų, o šio gamybos būdo kaip privalumas nurodoma tai, kad vaistinių augalų priedai gamybos metu nėra atskiri nuo medaus, ir jų pridėjimas tokiu natūraliu būdu leidžia išvengti nepageidaujamų mikroorganizmų patekimo į medų maišymo metu.

Selektyvaus medaus su pakeista sudėtimi ir tikslinėmis gydančiomis savybėmis panaudojimas žmonėms gydyti ir sveikatai stiprinti aprašomas Rusijos patentuose: paraiškoje RU2013127697 nurodytas efektas - gauto selektyvaus medaus naudojimas leidžia kompensuoti maistingų medžiagų trūkumą, sustiprina bendrąjį organizmo atsparumą nepalankiems aplinkos faktoriams, padeda surišti ir pašalinti iš organizmo svetimos kilmės biologines medžiagas. Patente RU2129361C1 aprašytas medus su padidinto biologinio aktyvumo savybėmis, kurį patariama naudoti gydant kvėpavimo takų susirgimus, taip pat patente nurodomas efektyvus ir paprastas tokio medaus gamybos būdas. Patente RU2355164 aprašytas medus su padidinto biologinio

aktyvumo savybėmis, tokiomis kaip antioksidacinėmis, adaptogeninėmis, antistresinėmis, ir atstatomosiomis savybėmis žmogaus sveikatai. Šiuose patentuose selektyvus medus gaminamas pridedant į bičių maitinimo sirupą natūralių vaistinių priedų - vaistažolių ekstrakto, tokių, kaip liucerna, pupamedis, eukalpto lapai, anyžių lapų ir vaisių, aguonos žiedlapių ir eilės kitų.

Tarptautinėse patento paraiškose sutinkamas specialios paskirties priedų naudojimas gaminti selektyvų medų su numatytomis gydančiomis savybėmis. Patento paraiškoje WO2017013661A1 aprašyta specialaus medaus gamyba su kanapių aliejaus priedais THC ir CBD. Patentas aprašo bičių maitinimo mišinį, sudarytą iš bičių maisto pagrindo bei kanabinoidų THC arba CBD, medaus gamybos būdus, medų, gaunamą šiais būdais, ir šio medaus naudojimą gydymo tikslams – mažinti skausmus pacientams daugelio skirtingų susirgimų, susijusių su skausmu, atvejais. Kita tarptautinė patento paraiška WO2006080019A1 aprašo būdą gaminti bičių medų, kur paruošiamas bičių maistas, bitės maitinamos tuo maistu, ir po to surenkamas bičių medus, gautas po maitinimo. Šio metodo išskirtinumas yra tas, kad bičių maisto sudėtyje specialiai pridedama žinduolių kraujo, o juo pamaitinus bites, gauto bičių medaus sudėtyje atitinkamai esama kraujo sudėtinių medžiagų. Šis medus gaminamas specialiu medicininiu tikslu, šio medaus duodama chemoterapinio gydymo kursą praeinantiems pacientams, kad mažinti chemoterapijos gydymo įvairius šalutinius efektus.

Apžvelgus ankstesnio technikos lygio išradimus, matyti, kad bites maitinti, bites gydyti nuo jų susirgimų, išgauti selektyvų natūralų medų su pakeista sudėtimi bei gydomosiomis savybėmis, yra naudojami įvairūs ir skirtingi metodai. Taip pat, gaminti medų su numatytomis gydomosiomis savybėmis, yra naudojami įvairūs vaistiniai augaliniai ir gyvūninės kilmės priedai. Apžvelgtų metodų pastebėtas trūkumas yra tas, kad bitės maitinamos mišiniais su priedais, siekiant įvairių tikslų, tačiau šie skirtingi tikslai būna tam tikros siauros paskirties, ir nepapildo vienas kito bičių ir žmonių bendrai naudai. Vienų augalų priedai labiau tinka bites maitinti ir gydyti, tačiau nebūtinai naudingi ir skanūs žmonėms (pavyzdžiui, esenciniai aliejai, skirti gydyti bites nuo erkių). Kitų augalų ir medaus priedų savybės yra skirtos žmonėms gydyti, tačiau nėra būtinos ar kaip nors aiškiai naudingos bitėms, pavyzdžiui, THC ir CBD kanabinoidai, kaip atskleista tarptautinėje patento paraiškoje WO2017013661A1, arba žinduolių kraujo priedai, kaip atskleista tarptautinėje patento paraiškoje WO2006080019A1. Patento paraiškoje US2011039001A1, maitinant bites mišiniu su augaliniais priedais, tikslas yra

5 tik pakankamai pamaitinti bites ir suteikti joms augalinių maisto medžiagų bei vitaminų, tačiau šioje paraiškoje išvardinti augaliniai priedai gali būti nesuderinami su medaus gamyba, todėl toks maitinimas galimas ne medunešio laikotarpiu. Tačiau ir medunešio laikotarpiu bitėms būna reikalingas papildomas maitinimas, sveikatos palaikymas bei gydymas, ir svarbu, kad tam naudojami priedai derėtų su medaus gamybos procesu ir nepakeistų netinkamai medaus skonio, sudėties bei savybių.

IŠRADIMO ESMĖ

10 Tam, kad išvengti aukščiau išvardintų bičių maitinimo, gydymo ir medaus gamybos trūkumų, ir apjungti kelis bičių maitinimo tikslus į vieną maitinimo būdą, šiame išradime yra sukurtas naminių bičių (*Apis mellifera*) maitinimo, sveikatos stiprinimo ir pakeistos sudėties medaus gamybos būdas, naudojant tam tikrų rūšių maistinius ir vaistinius augalus, būtent, dygliuotojo šaltalankio uogas, vienapiestės gudobelės uogas, juodųjų serbentų uogas, paprastąjį agurką, didžiąsias dilgėles, citriną ir paprastąjį amalą. Išvardinti augalai, juos paruošus tam tikru būdu, yra naudingi ir/arba 15 gydantys ir žmonėms ir bitėms, o tiek bičių maitinimas bei sveikatos stiprinimas, tiek pakeistos sudėties medaus su gamyba yra vykdomi reguliuojant (koordinuojant) bičių šeimos gyvenimo ir veiklos natūralų procesą, kaip įprasta bitininkystėje.

20 Vaistinių augalų priedų savybės meduje, dėl medaus vaistinių ir antibakterinių savybių bei medaus lengvo pasisavinimo organizme, gali būti stipriau išreikštos ir atskleistos, nei naudojant vien tik vaistinius augalus, jų arbatas arba ekstraktus (kaip atskleista patento paraiškoje WO2017013661A1). Todėl, vaistinius augalus tinkamai perdirbus ir jų ekstraktus įterpus natūraliame medaus gamybos procese, vaistinių augalų aktyvių medžiagų selektyvaus medaus sudėtyje poveikis gali būti sustiprintas labiau, nei naudojant vien šiuos augalus arba jų ekstraktus be medaus arba tik 25 mechanškai sumaišius su medumi.

30 Išradimo būdas apima šiuos žingsnius: bičių maitinamojo sirupo paruošimą, kurio metu vaistinių augalų (dygliuotojo šaltalankio uogų, vienapiestės gudobelės uogų ir (arba) kitų šiame išradime išvardintų) sultys arba tyrė sumaišomi su medumi ir vandeniui tam tikromis proporcijomis; medunešių bičių maitinimą šiuo sirupu tam tikru režimu, metų bei sezono laiku ir periodiškumu, su tikslu arba tik pamaitinti bites, arba tik išgauti selektyvų medų, arba abiejų tikslų kombinacija; selektyvaus medaus išgavimą, kuriame bitės suneša medų arba vien tik iš maitinimo sirupo ir šio medaus sudėtis

laikoma tikslia, arba ir iš laukų žiedų nektaro, ir iš maitinamojo sirupo - tokio medaus sudėtis vadinama pakeista.

Esminis šio bičių maitinimo bei selektyvaus medaus gamybos būdo privalumas ir išskirtinumas yra tam tikros augalų rūšys, kurių savybės leidžia kompleksiskai pasiekti kelis tikslus vienu metu: pamaitinti bites, pagerinti bei palaikyti bičių sveikatą, ir gauti selektyvų medų su pakeista sudėtimi bei numatytomis žmones gydančiomis savybėmis.

BRĖŽINIŲ PAVEIKSLŲ APRAŠYMAS

Brėžinių paveikslai yra pateikti tik kaip nuoroda į galimą išradimo įgyvendinimą ir jokių būdu neturi riboti išradimo apimtį. Nei vienas iš pateiktų brėžinių ir grafikų neturėtų būti laikomi ribojančiais, o tik kaip galimo išradimo įgyvendinimo pavyzdžiais.

Fig. 1 Bičių maitinimo sirupo avilyje priemonės ir jų įrengimas.

Fig. 2 Bičių maitinimo vaistiniu sirupu procesas ir procese gaunami rezultatai.

Fig. 3 Avilys su bičių išleistuvu, skirtas maitinti bites vaistiniu sirupu ir gauti selektyvų medų su žinoma sudėtimi pagal gamybos būdo variantus 24.5 ir 24.6.

Fig. 4 Bičių išleistuvo tarp avilio atskirtų aukštų konstrukcija.

PAVEIKSLAI – Skaitiniai objektų pažymėjimai paveiksluose

- 1 bičių avilys;
- 2 avilio viršus (stogelis), nukeltas;
- 3 avilio laka;
- 4 meduvės (korai su rėmeliais), sustatytos avilyje;
- 6, 7 bičių maitinimo sirupas, supilamas į bičių maitintuvę;
- 10 bičių maitintuvė;
- 11 bičių maitintuvės lovelis, kuriame supiltas bičių maitinimo sirupas;
- 12 bičių maitintuvės viršaus dangtelis, skaidriai permatomas;
- 13 bičių maitinimo sirupo pripylimo anga su sieteliu;
- 14 medinės grotelės bitėms tupėti, plaukiančios maitinimo sirupo paviršiumi;
- 15 bičių patekimo į maitintuvę lovelio dugne iškilusios angos;
- 20 vaistinių augalų priedų parinkimo į bičių maitinimo sirupą žingsnis;

- 21** bičių maitinimo sirupo komponentų ir jų proporcijų parinkimo žingsnis;
- 22** bičių maitinimo sirupo paruošimo žingsnis;
- 23** bičių maitinimo režimo ir siekiamo rezultato parinkimas;
- 24.1-24.6** bičių maitinimo režimai ir jų naudojimu siekiami/numatomi rezultatai;
- 5 **30** daugiaaukštis avilys, su atskirtais viršutiniais aukštais, paruoštas maitinti bites sirupu ir nešti iš jo selektyvų medų;
- 31** bičių šeimos (lizdo) aukštai su meduvėmis;
- 32** avilio išorinė laka;
- 33** avilio aukštų atskyrimo segmentas, su bičių išleistuvu ir ventiliacija;
- 10 **34** bičių išleistuvas tarp avilio aukštų, su ventiliacijos grotelėmis;
- 35** bičių išleistuvo būsenų perjungimo svirtis;
- 36** bičių išleistuvo dvi būsenos: bičių įleidimo į viršutinius aukštus ir išleidimo iš jų;
- 37** bičių praėjimo kanalai bičių išleistuve;
- 38** oro ventiliacijos grotelės bičių išleistuve (tarp avilio aukštų);
- 15 **39** bičių išleistuvo antrasis diskas su grioveliais;
- 40** avilio papildomi aukštai su meduvėmis, skirti nešti į juos selektyvų medų tik iš sirupo, esančio maitintuvėje;
- 41** bičių maitintuvė su sirupu, uždedama ant selektyviam medui skirtų avilio aukštų;
- 42** medinės grotelės bitėms tupėti, plūduriuojančios maitinimo sirupo paviršiuje;
- 20 **43** maitintuvės anga, skirta bitėms judėti ir nešti sirupą iš maitintuvės į žemiau esančių aukštų meduves;
- 44** maitintuvės viršaus skaidrus dangtis;
- 45** maitinimo sirupo pripylimo į maitintuvę anga, su sieteliu/ventiliacija;
- 46** bičių maitinimo sirupas su vaistinių augalų priedais, pilamas į maitintuvę;
- 25 **48** avilio viršaus dangtis (stogas), nepraleidžiantis šviesos, šilumos ir drėgmės, turintis sirupo pripylimo angą atitinkančią išpjovą.
- 51** bičių išleistuvo siaurėjantys kanalai.

DETALUS ĮGYVENDINIMO VARIANTŲ APRAŠYMAS

- Čia ir toliau išradimo įgyvendinimo variantai aprašomi su nuorodomis į brėžinius, tačiau išradimo įgyvendinimo variantai nėra ribojami čia atskleistiems išradimo įgyvendinimo variantams, ir įvairios įgyvendinimo variantų modifikacijos yra galimos.

Augaliniai priedai bičių maitinimo sirupe. Išradime bičių maitinimo vaistinį sirupą ruošti naudojamas vienas arba keli iš šių augalų, turinčių maistines, vaistines ir gydomąsias savybes:

- Vienapiestė gudobelė (*Crataegus monogyna*), naudojamos uogos;
- Dygliuotasis šaltalankis (*Hippophae rhamnoides*), naudojamos uogos;
- Juodieji serbentai (*Ribes nigrum*), naudojamos uogos;
- Didžioji dilgėlė (*Urtica dioica*), naudojami lapai;
- Citrina (*Citrus*), naudojami citrinų vaisiai;
- Paprastasis agurkas (*Cucumis sativus*), naudojami vaisiai.
- Paprastasis amalas (*Viscum album*), naudojama amalo šakelių masė;

Vienapiestė gudobelė: gudobelės žieduose yra flavonoidų (hiperozidas, kvercetas, vitebsinas), fenolkarboninių rūgščių, rauginių medžiagų, saponinų, nedaug eterinio aliejaus. Vaisiuose yra 2–5 % flavonoidų (hiperozidas), rauginių medžiagų, organinių rūgščių, apie 10 % sacharidų, pektinų, karotinoidų, riebalinio aliejaus, saponinų. Gudobelių preparatai pasižymi kardiotoninu poveikiu, tai yra stiprina širdies raumenį ir sumažina jo susitraukimų skaičių (pulsą). Taip pat veikia raminančiai, šiek tiek kraujo spaudimą mažinančiai. Gydomosios savybės: gudobelių preparatai mažina centrinės nervų sistemos jautrumą, tonizuoja širdies raumenis. Iš gudobelės žaliavos pagaminti preparatai laikomi gera širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos bei gydymo priemone senyvo, pagyvenusio amžiaus žmonėms. Jie vartojami kaip priemonė, padedanti reguliuoti širdies ritmą, plečianti širdies ir galvos smegenų kraujagysles, mažinanti kraujo spaudimą. Jie vartojami ankstyvoje hipertenzijos stadijoje ar kaip pagalbinė priemonė sergant aritmija ir tachikardija, gerina sergančiųjų širdies ligomis sutrikusį miegą, širdies ir smegenų kraujotaką. Rekomenduojama vartoti aterosklerozės gydymui ir profilaktikai. Tyrimo eiga ir palankiausios natūralios bičių maitinimo sąlygos: Gudobelių uogos, skirtos ruošti bičių maitinimo vaistinį sirupą gali būti naudojamos šviežios arba džiovintos. Rudeniniame maitinime ir medaus gamyboje naudojamos šviežios uogos, o pavasarį – džiovintos. Gudobelių uogos sunoksta rugsėjo mėnesį, todėl uogos džiovinamos +40-45°C atsižvelgiant į uogų morfologiją, 3-4 paras. Prieš džiovinimą uogos būna tamsiai raudonos, o po džiovinimo vaisiai pakinta, tampa raukšlėti, tamsiai raudoni, silpno kvapo, sutraukiančio skonio. Sudžiovintos uogos laikomos gerai vėdinamoje, mažai drėgmės turinčioje patalpoje, kur palaikomoji temperatūra yra 20-22°C.

Dygliuotasis šaltalankis: Dygliuotasis šaltalankis yra unikalus ir vertingas

5 augalas, išsiskiriantis gydomosiomis ir maistinėmis savybėmis. Šaltalankių vaisiai pasižymi priešuždegiminiu, priešmikrobiniu ir skausmą malšinančiu poveikiu, skatina audinių regeneraciją, stiprina imuninę sistemą ir vartojami kaip prevencinė priemonė nuo vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų. Šaltalankių vaisiuose esantys polifenoliai pasižymi

10 antioksidantinėmis savybėmis ir gali apsaugoti žmogaus organizmą nuo oksiduotų radikalų žalingo poveikio. Šaltalankių vaisiai pasižymi įvairiais gydomaisiais poveikiais dėl sudėtyje esančių įvairių junginių, kurių pagrindiniai, o taip pat jų farmakologiniai–fiziologiniai poveikiai pateikti 1 lentelėje. Šaltalankio farmakologinį poveikį taip pat lemia vitaminai, mikroelementai, aminorūgštys ir kiti biologiškai aktyvūs junginiai, pvz.: β-karotenas, zeaksantinas, likopenas, flavonoidai, folio rūgštis, triterpenai, riebiosios rūgštys.

Junginys	Gydomosios savybės
Tokoferoliai	Veikia kaip antioksidantai, apsaugo nuo lipidų oksidacijos ir padeda sumažinti skausmą
Karotenoidai	Veikia kaip antioksidantai, dalyvauja kolageno sintezėje ir epitelizacijoje
Vitaminas K	Palaiko normalų kraujo krešėjimą, stabdo kraujavimą, skatina žaizdų gijimą, pasižymi priešopiniu poveikiu
Vitaminas C	Veikia kaip antioksidantas, palaiko ląstelių membranų vientisumą, pagreitina kolageno sintezę
Vitamino B kompleksas	Skatina ląstelių atsinaujinimą ir nervų regeneraciją
Fitosteroliai	Gerina mikrocirkuliaciją odoje, pasižymi priešopiniu, antiaterogeniniu ir priešvėžiniu poveikiu. Reguliuoja uždegiminį procesą
Polifenoliniai junginiai	Veikia kaip antioksidantai, būdingas ląsteles apsaugantis ir kardioapsauginis poveikis. Skatina žaizdų gijimą
Polinesočiosios riebiosios rūgštys	Pasižymi imunomoduliuojamu, neuroapsauginiu ir antinavikiniu poveikiu
Organinės rūgštys	Mažina širdies priepuolio ir insulto riziką. Būdingas priešopinis, antiartritinis ir skatinantis žaizdų gijimą poveikis
Kumarinai ir triterpenai	Dalyvauja apetito, miego, atminties ir mokymosi reguliavime
Cinkas	Stiprina kraujotaką, veikia kaip fermentų kofaktorius. Reikalingas

Lentelė 1. Šaltalankio uogose esantys junginiai ir jų gydomosios savybės.

Tyrimo eiga ir palankiausias natūralios maitinimo sąlygos: Šaltalankių uogos prinoksta rugpjūčio antroje pusėje – rugsėjo mėnesiais. Šiuo laikotarpiu bičių šeimos jau ruošiamos žiemos sezonui, todėl bites galima maitinti ir sirupu su šaltalankiais bei leisti joms sunešti medaus su šaltalankio turinčia sudėtimi ir vaistinėmis savybėmis. Bičių maitinimo vaistinį sirupą ruošti naudojamos šaltalankio uogų sultys, šviežios (rudeni) arba šaldytos (pavasari). Ruošiant sultis pavasariui, išspausťos sultys yra iškart atšaldomos iki - 22°C temperatūros, tokioje temperatūroje laikomos per žiemą, o pavasario sezonu jos atšildomos kambario temperatūroje, kad būtų tinkamos gaminti bičių maitinimo vaistinį sirupą.

Šaltalankio uogose bitėms naudingas yra šaltalankių aliejus. Šaltinyje BIOLOGIJA. 2017. Vol. 63. No. 2. P. 177–184 „*The effect of thyme (Thymus caucasicus) ethanol extract on Varroa mite (Varroa destructor), an ectoparasite mite of Apis mellifera meda (Hym: Apidae)*“ nurodyta, kad šaltalankių ekstraktas turi insekticidinių savybių. Gydant bites šaltalankių sulčių, aliejaus ir medaus mišiniu, bitės maitinamos, apipurškiamos arba apšlakstomos, užtikrinant, kad sultys ir aliejus neatsiskirtų į sluoksnius ir mišinys su vienoda sulčių bei aliejaus proporcija tektų vienodai visoms bičių šeimoms.

Dar vienas empiriškai pastebėtas bičių maitinimo šaltalankių sultimis teigiamas efektas susijęs su tuo, kad šaltalankio vaisiai turi paviršinio pelėsio. Perdirbus šaltalankio vaisius į bičių maitinimo vaistinį sirupą, šis pelėsis suteikia bičių maitinimo vaistiniam sirupui antibiotinių savybių prieš bičių parazitus. Tuo pačiu, šaltalankių vaisiai turi ir vitaminų, stiprinančių bičių organizmo atsparumą bei geresnį organizmo pasipriešinimą parazitams, taip pat ir bičių erkėms. Todėl bičių erkės nyksta ir žūsta dėl šio kompleksinio antibiotinio ir vitaminų poveikio bitėms ir erkėms, o apšlakščius arba apipurškus bites šaltalankių sultimis, jos suaktyvėja ir valosi, valo viena kitą, taip nusivalydamos erkes, kurios, atsiskyrę nuo bitės, žūsta. Taip pat pastebėta, kad šiuo atveju erkės nebeatsiranda ir bičių peruose.

Juodieji serbentai: juodųjų serbentų uogose yra vitamino C, d-pireno, sabineno, kariofileno ir kitokių medžiagų junginių. Taip pat yra ląstelienos, cukraus (fruktozės, gliukozės, ramnozės), citrinos, vyno, gintaro, salicilo rūgščių, pektinų, raugų, flavanoidų, mineralinių medžiagų–aliuminio, geležies, fosforo, mangano, natrio, kalcio, sidabro, folio rūgšties, kalio, magnio, vitaminų: C, P, B1, B2, B6, B3, E, K, PP. Uogose

esančios medžiagos pasižymi sutraukiančiomis, prakaitą varančiomis savybėmis, skatina šlapintis, stabdo uždegimus. Serbentų uogos padeda nuo avitaminozės, mažakraujystės, pablogėjus apetitui jį sužadina. Juodųjų serbentų sulčių su medumi patariama gerti sergant bronchitu, laringitu. Tyrimo eiga ir palankiausios natūralios

5 maitinimo sąlygos: Prinokusios juodųjų serbentų uogos renkamos vasaros laikotarpiu, birželio-liepos mėnesiais, priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Geriausiam bičių maitinimo sirupo ruošimo variante ir rezultatų tyrimui yra naudojamos uogų sultys masės kiekiu 4 kilogramai, kuris sumaišomas su 4 kilogramais medaus. Šiuo sirupu bitės maitinamos kas 3 dienas, kol juo užpildys ir meduvėse esančius korius. Maitinimo
10 sirupo su serbentų sultimis kiekis gali būti ir didesnis, jei šiuo sezono laikotarpiu bitės aktyvios ir medų perdirba greičiau. Palankiausias metas maitinti bites, kai orai tampa vėsesni ir lietingi.

Didžioji dilgėlė: Dilgėlės lapuose yra 19,7% proteinų, 3,6% riebalų, 15–18% pelenų, 22,3% celiuliozės (žydėjimo metu iki 30%), 7,4% beazotinių medžiagų, nedidelis kiekis cukraus, skruzdžių rūgšties, tanidų, glikozido urticino, 15–19% įvairių
15 mineralinių medžiagų: daug kalcio (2,4–7,9%), kalio, natrio, magnio, geležies, silicio, sieros, chloro; vitaminų: C (0,6%), K, B2, B3; protoporfirino, koproporfirino, citosterino, histamino, fermentų (oksidazės, peroksidazės, chlorofilazės), karotino (47,8–116 mg%, o jaunuose augaluose iki 700 mg%), ksantofilo, ksantofilepoksido, violaksantino, 2–5%
20 chlorofilo (jaunuose net iki 7%). Dilginamuose plaukeliuose yra lakaus beazotinio toksino, be to, yra skruzdžių, riebiųjų rūgščių ir šiek tiek alkaloidų. Didžiosios dilgėlės preparatais gydoma mažakraujystė (padidina hemoglobino ir eritrocitų kiekį kraujyje), cukraligė, paralyžius, artritas, odos ligos, nudegimai ir sunkiai gyjančios žaizdos.

Tyrimo eiga ir palankiausios natūralios maitinimo sąlygos: Tiriamieji augalai surenkami gegužės-rugsėjo mėnesiais, priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Geriausiam maitinimo
25 sirupo paruošimo variante ir rezultatų tyrimui paruošiami 3 kilogramai dilgėlių sulčių ir sumaišomi su 1 kilogramu medaus. Gautas sirupas supilamas į bičių maitintuves. Maitinimo pradžioje, į maitintuvę pilama po 4 litrus dilgėlių - medaus sirupo kas 4 dienas, nes sezono pradžioje bitės silpnesnės, todėl gali sunkiau sirupą pasisavinti ir
30 nešti į korius. Tuo pat metu stebima, kaip greitai bitės sugeba perdirbti sirupą, o pastebėjus bičių didesnę pajėgumą, vėliau į maitintuvę pilamo sirupo kiekiai gali būti didinami.

Paprastasis agurkas: Vaistams vartojami agurkų žiedai, vaisiai (agurkai), vaisių sultys, žievė, sėklos ir lapai. Agurkai ir jų sultys ramina nervų sistemą, mažina kosulį,

skatina šlapimo ir tulžies išsiskyrimą, virškinimo liaukų sekreciją, pasižymi vidurius
laisvinančiomis, priešuždegiminėmis, minkštinančiomis ir skausmą malšinančiomis
savybėmis. Šviežios agurkų sultys vartojamos sergant kvėpavimo takų ligomis, kosint,
užkietėjus viduriams. Liaudies medicina agurkais gydo širdies ligas ir kraujagyslių
aterosklerozę, hipertoniją, inkstų ir kepenų ligas. Agurko sultys, sumaišytos su medumi,
naudojamos kosmetikoje kaip priemonė atgaivinti veido odą: šiam tikslui naudotini
dideli (peraugę) agurkų vaisiai, kuriuose aplink sėklas yra susidaręs didžiausias kiekis
agurko žele - tinkamiausios medžiagos medaus ir agurkų sirupui gaminti. Geriausiam
bičių maitinimo sirupo paruošimo variante ir rezultatams tirti: paruošiami 3 kilogramai
agurkų sulčių ir sumaišomi su 1 kilogramu medaus. Gautas sirupas supilamas į bičių
maitintuvę avilyje. Maitinimo pradžioje, į maitintuvę kas 4 dienas pilama po 4
kilogramus agurkų-medaus sirupo. Šiuo laikotarpiu reikia stebėti, kaip bitės geba
perdirbti supiltą sirupą: jei bičių šeimos pajėgumai pakankami, vėliau sirupo galima įpilti
daugiau.

Citrina: Citrinos nuo seno žinomos maistinėmis ir gydomosiomis savybėmis:
turi daug vitamino C, profilaktiškai padeda išvengti įvairių ligų, tame tarpe turi ir
priešvėžinių savybių. Citrinos naudojimas įvairus: jos valgomos, gaminami geriama
produktai ir preparatai, taip pat naudojamos išoriškai tepalų ir kompresų pavidalu,
atliekama aromaterapija. Šiame išradime svarbus ir šis aspektas: citrinų esencinis
aliejus žinomas kaip viena efektyviausių gydymo priemonių prieš bičių erkes (*varroa*
destructor, *varroa mites*). Todėl citrina yra augalas, tinkamas gaminti bičių maitinimo
sirupą, o juo maitinant bites, tikėtinas kompleksinis efektas: maitinamos bei gydomos
bitės, o taip pat gaunamas selektyvus medus su pakeista sudėtimi ir gydomosiomis
savybėmis. Geriausiam bičių maitinimo sirupo paruošimo variante ir rezultatams tirti
yra paruošiami 2 kilogramai citrinų sulčių ir sumaišomi su 2 kilogramais medaus bei 1
kilogramu šilto vandens. Gautas sirupas pilamas į bičių maitintuvę avilyje. Maitinimo
režimas, kaip ir kitų sirupų atvejais: kas 4-5 dienas į avilio maitintuvę įpilama po 5
kilogramus citrinų-medaus sirupo ir kartu stebima, ar bitės sugeba perdirbti įpiltą sirupą.
Atitinkamai, pakoreguojamas vėlesnio sirupo papildymo laikas ir kiekis.

Paprastasis amalas: Amalo gydomosios savybės pastebėtos nuo seno, jis
vartotas širdies veiklos nervinio pobūdžio sutrikimams gydyti. Amalo preparatai veikia
spazmolitiškai, kraujospūdį ir nervų sistemos jaudrumą mažinančiai, tinka nuo
aterosklerozės, nedidelės hipertenzijos, taip pat kaip kraujavimą stabdanti priemonė
(pavyzdžiui, kraujavimą iš nosies stabdyti), epilepsijai, nervų ligoms gydyti. Amalas dėl

turimų stipriai veikiančių ir nuodingų baltyminių medžiagų (viskotoksinų) ir glikoproteinų (lektinų) veikia kraujospūdį mažinančiai, vėžines ląsteles žudančiai ir didina organizmo atsparumą. Didžiausias poveikis gaunamas, kai amalo preparatai į organizmą patenka parenteriniu keliu (pavyzdžiui, injekuojant po oda) arba absorbuojant per gleivinę, tuomet jie veiksmingi, bet gali sukelti ir pašalinių poveikių. Amalas kaupia stipriai veikiančias baltymines medžiagas viskotoksinius ir glikoproteinę lektiną, choliną, acetilcholiną, askorbo rūgštį, karotiną, dervas, flavonoidus, mineralines medžiagas. Naudojami užpilai, ekstraktai, tinktūros, šviežios sultys, įeina į sudėtinių kraujotaką gerinančių preparatų sudėtį. Selektyvus medus su amalo priedu gali turėti sustiprintas arba papildomas gydomąsias savybes. Toks medus gaunamas pamaitinus bites sirupu su amalo sultimis, ir bitėms sunešus šį sirupą į korius. Geriausiam bičių maitinimo sirupo paruošimo variante ir rezultatų tyrimui, jaunos amalo šakelės su lapais kertamos vėlai rudenį ir žiemą nuo išverstų arba nupjautų medžių arba sekatorių pagalba. Iš šakelių spaudžiamos sultys ir užšaldomos iki pavasario -20-22°C temperatūroje. Pavasarį maitinimo sirupas paruošiamas, sumaišius 2 kilogramus amalo sulčių, 3 kilogramus medaus ir 1 kilogramą vandens.

Bičių vaistiniuose sirupuose komponentų proporcijos, priklausomai nuo medaus bei augalo sulčių konsistencijos, bičių maitinimo tikslo, gali būti keičiamos plačiose ribose. Pavyzdžiui, jei bitės profilaktiniais ir gydymo tikslais maitinamos grynomis šaltalankių sultimis, medaus gali būti įmaišoma tik tiek, kad bitės pradėtų sultis valgyti, pavyzdžiui, pridėjus medaus maždaug 20% masės. Tokiu atveju sulčių ir medaus santykis maitinimo sirupe yra 100:20. Dedant medaus mažiau nei 20%, sirupas yra per rūgštus bitėms.

Bičių maitinimo variantai ir numatomi rezultatai. Piešinyje Fig. 2 pavaizduotas maitinimo sirupo paruošimo ir maitinimo būdas, kurį sudaro bent šie žingsniai:

- (20) - augalinių priedų į bičių maitinimo sirupą parinkimas;
- (21) - sirupo komponentų proporcijų parinkimas;
- (22) - komponentų paruošimas (mirkymas, malimas) ir sirupo paruošimas. Būtina pažymėti, kad sirupuose yra naudojami natūralūs priedai be terminio apdorojimo (virimo, kaitinimo, plikimo verdančiu vandeniu ir kt.), siekiant išsaugoti augalų vitaminus ir naudingąsias medžiagas;
- (23) - bičių maitinimo tikslinio režimo parinkimas;
- (24.1)-(24.6) - bičių maitinimas pasirinktu režimu.

Anksčiau aprašyti sirupo paruošimo atvejai ir bičių maitinimo režimai laikomi *geriausiu šio išradimo variantu*, kiekvieno augalo atveju kaip atvaizduota (24.1 Fig. 2). Tai reiškia, kad maitinimo sirupo sudėtis ir konsistencija parenkamos tokios, jog bitės subalansuotai valgytų sirupą ir jo perteklių neštų savo skilveliuose į avilio korius. Tai maitinimo režimas, užtikrinantis kokybišką bičių mitybą su sveikatos stiprinimu ir ligų prevencija, o taip pat avilio koriuose yra sunešama ir natūralaus (antrinio) medaus, turinčio pakeistą sudėtį bei gydomąsias savybes, perkeltas natūraliu ir saugiu būdu iš augalų į medų. Geriausiam išradimo variante (24.1, Fig. 2) nenaudojamas bičių uždarymas avilyje ar kitokios priemonės, ribojančios bičių laisvą skraidymą ir maitinimąsi. Bitės maitinamos iš maitintuvės (10), kurios konstrukcija pavaizduota piešinyje Fig 1. Maitintuvę sudaro plastikinis lovelis (11) su dugne esančiomis bičių patekimo angomis (15), skirtomis bitėms įeiti į maitintuvę ir išeiti iš jos. Lovelio (11) dugne laisvai paguldomos medinės grotelės (14), kurios, priklausomai nuo pripilto sirupo lygio lovelyje (11), plūduriuoja sirupo paviršiuje, o bitės sirupą renka iš lovelio (11), tupėdamos ant grotelių (14) ir neskęsdamos sirupe. Maitintuvės lovelis (11) iš viršaus uždengiamas skaidriu dangčiu (12), kuriame yra įmontuota sirupo papildymo anga su sieteliu (13). Ši anga leidžia bitininkui greitai, netrukdam bičių darbo, papildyti maitintuvės (10) turinį papildomu sirupo kiekiu. Maitintuvė (10) pastatoma avilyje (1), ant meduvių (korių rėmelių) (4) viršaus, kaip parodyta piešinyje Fig. 1. Bitės, avilyje vaikščiodamos meduvėmis (4), gali per vamzdines angas (15) patekti į maitintuvės (10) vidų, rinkti sirupą ir, pririnkę jo savo skilveliuose, sugrįžti bei sunešti jį į meduves (4).

Kitame išradimo variante (24.2, Fig. 2) bitės gali būti maitinamos sirupu tik tiek, kiek pakanka jas pačias pamaitinti ir nesaugoti sirupo pertekliaus meduvėse. Vaistinio augalo masės santykis sirupe parenkamas bitininko nuožiūra arba kiek nurodyta geriausiam išradimo variante.

Dar viename išradimo variante (24.3, Fig. 2), bitės maitinamos sirupu, kuriame vaistinio augalo koncentracija padidinta tiek, kad bitėms yra vis dar priimtinas valgyti, bet maitinimas skirtas tik bičių sveikatai stiprinti su ligų prevencija. Pavyzdžiui, dėl sveikatos profilaktikos, bitės gali būti kelis kartus maitinamos šviežiomis šaltalankių sultimis, kuriose įmaišyta medaus minimaliai tiek, kad bitės pradėtų valgyti mišinį: masės santykiu 100:20, nes pasaldinus šaltalankio sultis medumi mažesniu santykiu, sultys per rūgščios bitėms valgyti.

Dar kitame išradimo variante (24.4, Fig. 2), kurio paskirtis yra labiau bičių gydymas nei maitinimas, bitės šlakstomos arba apipurškiamos šaltalankio mišiniu, kurio

sudėtyje yra šaltalankio sulčių ir ypač šaltalankio aliejaus, purškimo arba šlakstymo metu užtikrinant, kad mišinys su ta pačia sulčių ir aliejaus proporcija tektų vienodai visoms bičių šeimoms. Iš mokslinių tyrimų ir kitų patentinių paraiškų žinoma, kad varoatozės prevencijai yra naudojami augalų eteriniai aliejai, pavyzdžiui, mėtų, pipirmėčių, cinamono, citrinžolės. Eterinis aliejus natūraliu būdu atlieka ligų prevenciją ir suaktyvina bičių valymosi instinktus. Bitės, apšlakstytos arba apipurkštos eterinio aliejaus tirpalu, valo viena kitą ir taip padeda viena kitai atsikratyti parazitų. Panašus bičių gydymo būdas aprašytas patento paraiškoje US20070026765A1, ir čia naudojami sintetiniai ir natūralūs eteriniai aliejai iš mėtų, cinamono, citrinžolės ir kitų augalų, turinčių esencinio aliejaus, kur esenciniai aliejai maišomi su vandeniu ir šiuo tirpalu periodiškai apšlakstomos arba apipurškiamos bitės.

Dar viename išradimo variante (24.5 Fig. 2), bitėms avilyje esant sveikoms ir stiprioms, jos gali būti tam tikrą laiką maitinamos vien vaistiniu sirupu, ir neleidžiant joms rinkti žiedų nektarą iš kitur, pavyzdžiui, iš laukų per medunešį. Šiuo atveju bus gaminamas selektyvus medus su pakeista ir iš anksto žinoma sudėtimi. Tai reiškia, kad bitės į korius neš tik vaistinį sirupą iš maitintuvės (10), suvilgydamos jį savo seilėmis, ir šis suneštas medus bus be išorės priemaišų. Toks anksčiau surinkto medaus išėmimo ir bičių atskyrimo nuo aplinkos būdas yra atskleistas keliuose panašiuose išradimuose, pavyzdžiui, RU2355164, RU2013127697, RU2129361C1, ir šiuo būdu galima kontroliuoti antrinio, selektyvaus, medaus sudėtį.

Dar viename išradimo variante (24.6 Fig. 2), kuriame bitės maitinamos vien pasirinktų proporcijų vaistiniu sirupu, ir neleidžiant joms rinkti žiedų nektarą iš kitur, gaminamas selektyvus medus su iš anksto žinomomis vaistinėmis savybėmis. Bitės maitinamos sirupu, kurio sudėtyje yra iš anksto žinomas kiekis priedų/medžiagų su vaistinėmis savybėmis, pavyzdžiui gudobelės uogų ekstrakto. Bičių suneštas selektyvus medus savo sudėtyje turės artimą santykinį kiekį minėtų vaistinių medžiagų, dėl ko šis medus pasižymės tomis gydomosiomis savybėmis, kurios numatytos pridėjus į sirupą reikiamą kiekį atitinkamų vaistinių medžiagų. Pavyzdžiui, kaip aprašyta patentų paraiškoje RU2355164, su liucernos priedu gydyti kvėpavimo takus, arba WO2017013661A1, su kanabinoidais malšinti skausmą tam tikrų susirgimų atvejais.

Tam, kad bitės rinktų medų tik iš maitintuvės, bet ne už avilio ribų, avilyje turi būti užtikrintas tinkamas temperatūros ir vėdinimo režimas ir bičių judėjimo reguliavimas. Vienas būdų gaminti selektyvų medų - avilyje užtikrinti dirbančioms bitėms tinkamą temperatūrą bei vėdinimą. Pavyzdžiui, panaudoti avilį, kuriame bičių šeimos (lizdo)

aukštai (31) (meduvės) su avilio išorine laka (32) yra atskirti nuo selektyvaus medaus gamybos aukštų (40), meduvių ir maitintuvės su sirupu (41). Tokio avilio (30) konstrukcija parodyta paveiksle Fig. 3. Avilyje bent du pirmieji aukštai (31) yra skirti bičių šeimai ir įprastiniam bičių skraidymui per avilio laką (32) rinkti nektarą lauke.

5 Toliau, ant pirmųjų aukštų (31) viršaus pastatomas aukštų atskyrimo segmentas (33), turintis bičių išleistuvą (34) su išleidimo angomis (37) ir bičių įleidimo-išleidimo būsenomis (36), išleistuvo valdymo svirtį (35), ir avilio aukštų ventiliacijos groteles (38). Papildomai kartu su atskiriančiu segmentu (33), gali būti panaudotas tinklelis, į avilio viršutinius aukštus neįleidžiantis motinėlių ir praleidžiantis tik bites darbininkes. Toliau,

10 ant skiriančio segmento (33) statomas bent vienas selektyvaus medaus rinkimo aukštas su meduvėmis (40). Toliau, ant šių aukštų statoma bičių maitintuvė su sirupu (41), turinti sirupo paviršiuje plūduriuojančias medines groteles (42) ir bičių praėjimo angą (43), per kurią bitės juda tarp maitintuvės (41) ir selektyvaus medaus aukštų (40). Maitintuvės (41) viršus nuolat uždengtas skaidriu dangčiu (44, pavyzdžiui, organinio

15 stiklo) su anga (45), turinčia sietelį – permatomas dangtis (44) trumpu laikotarpiu leidžia stebėti maitintuvėje esančias bites, per angą galima patogiai pripilti reikiamą kiekį maitinimo sirupo (46), o taip pat per angą (45) vyksta avilio viršutinių aukštų (40) efektyvi ventiliacija. Ilguoju laikotarpiu, ant permatomo dangčio (44) viršaus uždedamas dangtis (avilio stogas) (48), nepraleidžiantis šviesos, šilumos bei drėgmės, ir turintis

20 sirupo papildymo ir ventiliacijos angai (45) atitinkančią išpjovą. Tokiame avilyje, bitės gyvena apatiniuose aukštuose (40), taip vadinamame bičių šeimos lizde. Gaminant selektyvų medų, maitintuvė (41) užpildoma maitinimo sirupu (46), tuomet atidaromas bičių išleistuvas (34), kad bitės galėtų patekti į selektyvaus medaus aukštus (40). Prisirinkus šiuose aukštuose (40) pakankamai bičių, bičių išleistuvas (34) uždaromas į

25 bičių išleidimo būseną. Viršutiniuose aukštuose (40) susibūrusios bitės juda tik tarp maitintuvės (41) ir meduvių, pernešdamos maitintuvėje surinktą sirupą į meduves, ir toks bičių judėjimas vyksta tol, kol maitintuvė ištuštėja arba užsipildo viršutinių aukštų (40) meduvės. Kai avilio viršutiniuose aukštuose (41) iš sirupo suneštas medus subręsta, tuomet bitės per išleistuvo (34) kanalus (51) pačios išeina į apatinius avilio

30 aukštus (31).

Bičių išleistuvas (34) parodytas priešinyje Fig. 4. Jo konstrukcija skiriasi nuo standartinio 8 arba 16 kanalų išleistuvo konstrukcijos (Fig 4a). Išleistuvas (34) sudarytas iš dviejų diskų ir turi dvi būsenas (Fig 4b). Vienas diskas (34) yra standartinis diskinis bičių išleistuvas su 8 ar 16 išėjimo kanalų (51) ir ventiliacijos grotelėmis. Jo

kanalai (51) siaurėjantys, todėl bitės gali eiti išleistuvo kanalais tik viena kryptimi. Antrasis diskas (39) pritvirtintas nejudamai prie avilio aukštus atskiriančio segmento (33) ir vidiniame paviršiuje turi negilius (apie 4 mm gylio) griovelius (37), kurių išdėstymas atitinka pirmojo disko kanalus (51). Šių griovelių (37) gylis per mažas bitei patekti į griovelio (37) angą, tačiau jei grioveliai (37) sutapdinami su pirmojo disko kanalais (51), tuomet bitė „praplatintais“ kanalais (Fig. 4c) gali ir įeiti į atskirtuosius avilio aukštus (40). Tokiu būdu išleistuvas (34) turi bičių įleidimo būseną (Fig. 4c), antroji yra bičių išleidimo būseną (Fig. 4d), o būsenų perjungimas atliekamas svirtimi (35).

Bičių maitinimo sirupo komponentų santykis pagal masę gali skirtis plačiose ribose, priklausomai nuo maitinimo paskirties ir sirupo komponentų savybių. Pavyzdžiui, maistas bičių sveikatai palaikyti gali būti sudarytas beveik iš grynų šviežių šaltalankio sulčių, pridėjus į jas tik šiek tiek medaus. O gaminant medaus produktą su pakeista sudėtimi, maišoma masės santykiu 2 kilogramai sumaltų gudobelių uogų, 2 kilogramai medaus, 2 kilogramai šaltalankio sulčių ir 1 litras vandens. Tačiau šis masės santykis gali kisti ir priklausomai nuo to, ar gudobelės uogos šviežios ar džiovintos, medaus tirštumo, kiek papildomai pripilti vandens, kad sirupas taptų tinkamai skystas bitėms maitintis ir pan.

Medaus produkto su pakeista sudėtimi gamybos aprašymas. Sukurtas bičių produktas, skirtas žmonių sveikatinimui ir sveikatai gerinti. Toliau aprašomas rudeninis gamybos variantas rugsėjo mėnesį, kai vaistiniai augalai surenkami ir gamybai naudojami švieži.

Produkto gamybai pasirinkti du vaistiniai augalai: vienapiestė gudobelė ir dygliuotasis šaltalankis. Šių augalų uogos buvo surinktos miško teritorijoje. Gudobelės yra žinomos, kaip turinčios gydomųjų savybių, gerina širdies darbą, stiprina kraujotaką ir turi teigiamą poveikį nervų sistemai. Šaltalankių vaisiai pasižymi priešuždegiminiu, priešmikrobiniu poveikiu, skatina audinių regeneraciją, stiprina imuninę sistemą, vartojama kaip priemonė nuo vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų. Iš šių dviejų augalų vitaminų, įvairių rūgščių ir cheminių junginių, visiškai natūraliu būdu maitinant bites gudobelių ir šaltalankių sirupu, buvo sukurtas medaus produktas.

Įprastu būdu, rugpjūčio mėnesį bitynė pradeda maitinti bites prieš žiemos laikotarpį. Pasirinktai bičių šeimai, kuriai vėliau bus duodamas vaistinis sirupas, šio priešžieminio maitinimo metu nėra naudojami jokie vaistai nuo erkių. Per rugpjūčio mėnesį maitinamos bitės pripildo savo lizdo meduves žiemai skirtu sirupu atsargomis.

Rugsėjo pradžioje, visas bites pilnai pamaitinus prieš žiemą, po to numatytame avilyje uždedamos papildomos tuščios meduvės (pavyzdžiui, papildomas avilio aukštas), ir pradedamas ruošti bičių maitinimo sirupas su vaistinių augalų priedais.

Surinktos šviežios gudobelių uogos sumalamos ir pasveriami 2 kilogramai sumaltų uogų masės, į kurią pridedama 2 kilogramai medaus. Tada uogų masė ir medus sumaišomi ir šis mišinys laikomas 12 valandų kambario temperatūroje, kad dalis veiksmingųjų gudobelės medžiagų „pereitų“ į medų. Gautas mišinys yra klampus ir tirštas, bet dėl medaus poveikio jis palaipsniui suskystėja.

Po to išspaudžiamos šviežios šaltalankių sultys, kurių pasveriami taip pat 2 kilogramai. Išspaustos šviežios sultys turi būti greitai panaudotos, kad jose neprasidėtų rūgimo procesai. Toliau, gudobelių ir medaus mišinys sumaišomas su šaltalankių sultimis, ir visas gautas mišinys praskiedžiamas 1 litru šilto vandens, kad gautas maitinimo sirupas būtų pakankamai skystas bitėms pasisavinti. Gauta maitinimo sirupo masės išeiga yra 7 kilogramai. Gautas maitinimo sirupas supilamas į bičių maitintuvę avilyje. Tokios sudėties, kiekio ir masės proporcijų sirupu pasirinkta bičių šeima rugsėjo mėnesio laikotarpyje pamaitinama dar du kartus. Iš viso, pasirinkta bičių šeima buvo maitinama 3 kartus, kiekvieną kartą į maitintuvę supilant po 7 kilogramus sirupo, viso supilta 21 kilogramas sirupo.

Šiuo konkrečiu atveju, kadangi bičių lizdo meduvės avilyje neatskirtos nuo papildomų meduvių, todėl dalis sirupo su vaistinių augalų priedais gali patekti ir į bičių šeimos lizdo meduves. Dalį vaistinio sirupo sunaudos pačios bitės, jį perdirbdamos, o likusią sirupo dalį bitės neša į papildomai uždėtas meduves (korius rėmeliuose). Taip pat, dalis sunešto sirupo masės prarandama dėl vandens išgarinimo medaus nešimo ir brendimo koriuose metu. Pabaigus maitinimą, rugsėjo pabaigoje iš papildomai uždėtų meduvių išsukta 8 kilogramai medaus produkto su vaistinių augalų (gudobelės ir šaltalankio) priedais. Gauta išeiga: 8 kilogramai medaus, supylus į maitintuvę 21 kg. sirupo. Lyginant su kitomis šeimomis, ši bičių šeima yra daug aktyvesnė, nes maitinasi šiuo vaistiniu sirupu. Aprašytoji bičių maitinimo ir medaus produkto gamybos technologija toliau plėtojama, atliekami jos tyrimai.

Kitame tokio medaus gamybos variante, gamyba vykdoma pavasarį ir vasarą, kovo-rugpjūčio mėnesiais. Tikslus tinkamiausias periodas kas metai gali skirtis, priklausomai nuo gamtos sąlygų, bičių šeimos aktyvumo ir pasirengimo nešti medų. Skirtingai nuo rudens gamybos, pavasarinį-vasarinį sirupą ruošti naudojamos džiovintos gudobelių uogos ir rudenį išsunktos bei užšaldytos šaltalankių sultys. Šaldytų

šaltalankio sulčių saugojimo per žiemą optimali temperatūra yra minus 20–22°C. Šiame gamybos variante 800 gramų džiovintų ir sumaltų į miltelius gudobelės uogų sumaišoma su 2 kilogramais medaus, tada mišinys kambario temperatūroje laikomas 12-24 valandas. Po to, į mišinį supilami 2 kilogramai greitai atšildytų šaltalankio sulčių ir apie 2,2 litro šilto vandens. Tokiu būdu, bičių maitinimo sirupo masė gaunama irgi 7 kilogramai, kaip ir rudeninės gamybos variante. Gautas sirupas pilamas į avilyje įrengtą maitintuvę, iš kurios bitės sirupą renka ir neša į avilio meduves. Šiame gamybos variante, maitinimo periodiškumas ir sirupo kiekiai numatomi analogiškai, kaip ir rudenį, tačiau gali būti ir keičiami, priklausomai nuo gamtos sąlygų bei bičių aktyvumo - tą įvertinti, reikalingas bitininko stebėjimas.

Aukščiau nurodyti bičių maitinimo sirupo komponentų (gudobelių, šaltalankių, medaus ir vandens) konkretūs kiekiai ir proporcijos gali skirtis, priklausomai nuo gaminamo medaus produkto pageidaujamų savybių, planuojamos sudėties bei jos tikslumo. Gamybos būdo aspektu, komponentai gali būti maišomi įvairiomis proporcijomis, kurios bitėms priimtinos ir nežalingos, kad jos valgytų sirupą ir neštų jį į avilio meduves.

Dar kituose medaus produkto gamybos variantuose, ruošti bičių maitinimo sirupą gali būti naudojami vieno augalo priedai, o sirupo komponentai maišomi proporcijomis, pateiktomis 2 lentelėje.

Vaistinio augalo priedas	Vaistinio augalo priedo masė, kg	Medus, masė kg	Vanduo, masė, kg	Sirupo išeiga, masė, kg
Šviežia gudobelė: sumalta uogų masė	2 kg	2 kg	1 kg	5 kg
Džiovinta gudobelė: sumalti milteliai	0,8 kg	2 kg	2,2 kg	5 kg
Šaltalankis: sultys, šviežios arba šaldytos	2 kg	2 kg	1 kg	5 kg
Citrina: sultys	2 kg	2 kg	1 kg	5 kg
Juodieji serbentai, uogos: sultys	4 kg	4 kg	-	8 kg
Dilgėlė: sultys	3 kg	1 kg	-	4 kg
Agurkas: sultys	3 kg	1 kg	-	4 kg

Lentelė 2. Bičių maitinimo sirupo su augalų priedais gamybos sudėtis ir jos dalys.

Medaus su amalo sultimis gamyba. Sukurtas bandomasis bičių medaus produktas gydyti tuos žmonių susirgimus, kurių atvejais numatytas amalo panaudojimas. Kadangi amalas turi nuodingų medžiagų, pavyzdžiui, JAV Maisto ir Vaistų Valdybos (FDA) traktuojamas, kaip „nesaugus“, todėl medaus su amalo priedu naudojimas galimas tik su gydytojo nurodymu ir patyrusio gydytojo priežiūroje.

Medaus produkto su amalo priedu gamybai gali būti naudojami tik uždaros gamybos būdai 24.5 ir 24.6, kuriuose sirupą bitės neša į meduves tik atskirtoje avilio dalyje, ir neneša į kitas meduves. Bičių maitinimo sirupas su amalo sultimis ruošiamas 3 lentelėje pateiktomis proporcijomis

Vaistinio augalo priedas	Vaistinio augalo priedo masė, kg	Medus, masė kg	Vanduo, masė, kg	Sirupo išeiga, masė, kg
Amalo šakelių sultys	2 kg	3 kg	1 kg	6 kg

Lentelė 3. Bičių maitinimo sirupo su amalo sultimis gamybos sudėtis ir jos dalys.

Sirupui naudojamos tik amalo šakelės. Uogos nenaudojamos, nes nuodingos. Maitinimas vykdomas pavasarį, avilio maitintuvės periodiškai pripildomos 3-4 kartus po 4-6 kilogramus, stebint bičių šeimos aktyvumą ir gebėjimą nešti medų.

APIBRĒŽTIS

1. Medunešiu bičiu sveikatos palaikymo ir gydymo būdas, naudojant sirupą su vaistinių augalų priedu, apimantis:

- sirupo paruošimą iš medaus, vandens ir vaistinio augalo priedo;
- bičių maitinimą, šlakstymą arba purškimą šiuo sirupu;

besiskiriantis tuo, kad vaistinių augalų priedas yra sultys iš dygliuotojo šaltalankio uogų su nepašalintu natūraliu pelėsiu ir uogų aliejingomis medžiagomis.

2. Medunešiu bičiu sveikatos palaikymo ir gydymo būdas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad sirupe, kuriuo maitinamos sveikos ir medų nešančios bitės, šaltalankio uogų sulčių kiekio santykis pagal masę gali sudaryti nuo 0,5% iki 40%.

3. Medunešiu bičiu sveikatos palaikymo ir gydymo būdas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad medaus rinkimo laikotarpiu bitės periodiškai maitinamos sirupu, apimančiu 80 masės % šviežių šaltalankių uogų sulčių su nepašalintu natūraliu pelėsiu su 20 masės % masės bičių medaus.

4. Medunešiu bičiu sveikatos palaikymo ir gydymo būdas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad bičių šeimos, kurios nemaitinamos sirupu pagal 2-3 punktus, yra periodiškai apšlakstomos arba apipurškiamos šviežių šaltalankių uogų sultimis su nepašalintu natūraliu pelėsiu ir šaltalankio uogų aliejingomis medžiagomis.

5. Medunešiu bičiu sveikatos palaikymo ir gydymo būdas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad bičių maitinimo pagal 3 punktą periodas yra nuo 7 iki 10 dienų arba 3-4 kartai per mėnesį.

6. Medunešiu bičiu sveikatos palaikymo ir gydymo būdas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad bičių apšlakstymo arba apipurškimo pagal 4 punktą periodas yra nuo 7 iki 10 dienų arba 3-4 kartai per mėnesį.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4a




Fig. 4b




Fig. 4c




Fig. 4d

Fig. 4